

**Guide pratique
de la consultation
en pédiatrie
10^e édition**

Chez le même éditeur

Diététique et nutrition, par M. Apfelbaum, M. Romon, M. Dubus, 2009, 528 pages.

Pneumologie pédiatrique : Guide pratique, par N. Beydon, 2011, 224 pages.

Pédiatrie, par A. Bourrillon, 2011, 6^e édition, 984 pages.

Le développement de l'enfant, aspects neuro-psycho-sensoriels, par A. De Broca, 2009, 312 pages.

Nutrition. Principes et conseils, par L. Chevallier, 2009, 256 pages.

Le développement affectif et intellectuel de l'enfant, compléments sur l'émergence du langage, par B. Golse, 2008, 400 pages.

101 urgences pédiatriques, par J. Lavaud, 2006, 464 pages.

Enfance et psychopathologie, par D. Marcelli, 2009, 736 pages.

Conduite du bilan neuropsychologique chez l'enfant, par M. Mazeau, 2008, 304 pages.

120 diagnostics à ne pas manquer, par É. Vidal-Cathala, C. Terlaud, 2009, 448 pages.

Dans la collection Médiguides :

Guide pratique du traitement des douleurs, par T. Binoche, C. Martineau, 2^e édition, 2005, 368 pages.

Guide pratique de psychogériatrie, par J.-P. Clément, N. Darthout, 2^e édition, 2009, 280 pages.

Guide pratique des épreuves d'effort cardiorespiratoires, par A. Cohen-Solal, F. Carré, 2009, 192 pages.

Guide pratique de pneumologie, par B. Dautzenberg, 2002, 336 pages.

Guide pratique d'ORL, par C. Dubreuil, Ph. Céruse, 2004, 224 pages.

Guide pratique de l'asthme, par B. Dautzenberg, 3^e édition, 2006, 184 pages.

Guide pratique d'urologie, par B. Dufour, 2002, 320 pages.

Guide pratique d'hématologie, par F. Garban, C. Barro, 2003, 216 pages.

Guide pratique de l'hypertension artérielle, par X. Girerd, J.-Y. Le Heuzey, S. Digeos-Hasnier, 3^e édition, 2005, 224 pages.

Guide pratique du diabète, par A. Grimaldi, A. Hartemann-Heurtier, 4^e édition, 2010, 312 pages.

Guide pratique de la consultation en gériatrie, par L. Hugonot-Diener, 2^e édition, 2007, 176 pages.

Guide pratique de la ménopause, par P. Lopès, F. Trémollières, 2^e édition, 2004, 216 pages.

Guide pratique de cancérologie, par J.-B. Méric, L. Zelek, D. Khayat, 3^e édition, 2004, 336 pages.

Guide pratique de cardiologie, par G. Jondeau, F. Beauvais, F. Chikli, C. Guiti, 2002, 320 pages.

Guide pratique de rhumatologie, par B. Mazières, A. Cantagrel, A. Constantin, M. Laroche, 2^e édition, 2002, 768 pages.

Guide pratique de psychiatrie, par F. Rouillon, 2^e édition, 2005, 176 pages.

Guide pratique de médecine physique et réadaptation, par A. Thevenon *et al.*, 2003, 272 pages.

Guide pratique de dermatologie, par D. Wallach, 3^e édition, 2007, 360 pages.

Guide pratique de la consultation en pédiatrie

Dr Jérôme Valleteau de Moulliac

Pédiatre libéral
Attaché consultant
Service de pédiatrie
de l'hôpital Ambroise-Paré, Boulogne
Pédiatre à la maternité
de l'hôpital Américain de Paris

Pr Jean-Paul Gallet

Professeur de pédiatrie
Doyen honoraire de la faculté de médecine Paris-Ouest
A initié les premières éditions

Avec le soutien du

Pr Bertrand Chevallier

Professeur des universités
Chef du service de pédiatrie
de l'hôpital Ambroise-Paré, Boulogne

10^e édition

Cet ouvrage tient compte des données les plus récentes au moment de sa publication. Tout lecteur doit cependant, sur le plan médico-légal, tenir compte des éventuelles erreurs et/ou omissions, et des possibles modifications des textes législatifs actuellement en vigueur, et vérifier les indications, les posologies et les précautions d'emploi des médicaments en se référant aux notices officielles d'utilisation.





Ce logo a pour objet d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, tout particulièrement dans le domaine universitaire, le développement massif du « photo-copillage ».

Cette pratique qui s'est généralisée, notamment dans les établissements d'enseignement, provoque une baisse brutale des achats de livres, au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.

Nous rappelons donc que la reproduction et la vente sans autorisation, ainsi que le recel, sont passibles de poursuites. Les demandes d'autorisation de photocopier doivent être adressées à l'éditeur ou au Centre français d'exploitation du droit de copie : 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris. Tél. 01 44 07 47 70.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés, réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent ouvrage, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
ISBN : 978-2-294-72704-7

Elsevier Masson SAS, 62, rue Camille-Desmoulins, 92442 Issy-les-Moulineaux cedex
www.elsevier-masson.fr

Abréviations

ADH	hormone antidiurétique
AFPA	Association française de pédiatrie ambulatoire
AINS	anti-inflammatoires non stéroïdiens
AMM	autorisation de mise sur le marché
APLV	allergie aux protéines du lait de vache
AR	antirégurgitation
BCG	bacille Calmette-Guérin
BEH	<i>Bulletin épidémiologique hebdomadaire</i>
BK	bacille de Koch
BREV	batterie d'évaluation rapide des fonctions cognitives
CAMSP	Centre d'action médicosociale précoce
CCQ	céphalée chronique quotidienne
CEDA	Centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme
CHAT	Check-list for Autism in Toddlers
CRA	Centre de référence autisme
CRAT	Centre de référence des agents tératogènes
CRP	protéine C réactive
CSHPF	Conseil supérieur d'hygiène publique de France
CTV	Comité technique des vaccinations
DDASS	Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales
DEGR	Douleur Enfants Gustave Roussy
DGS	Direction générale de la santé
DHA	acide docosahexaénoïque
DS	déviations standard
DTCaP	Diphthérie tétanos acellulaire polio
EBV	virus Epstein-Barr
ECBU	examen cyto bactériologique des urines
EDIN	Échelle douleur et inconfort du nouveau-né
EEG	électroencéphalogramme
EFR	exploration fonctionnelle respiratoire
EIP	enfant intellectuellement précoce
ENPI	énurésie primaire nocturne isolée
ERTL	épreuve de repérage des troubles du langage
ESPGHAN	European Society for Paediatrics Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
ESPID	European Society for Paediatrics Infectious Diseases
EVA	échelle visuelle analogique
FMF	fièvre méditerranéenne familiale
GH	<i>growth hormone</i>
GNA	glomérulonéphrite aigüe
HA	hypoallergénique
HAD	Hospital Anxiety and Depression Scale

VI

HAS	Haute Autorité de santé
HCSP	Haut Conseil de la santé publique
HIDS	<i>hyperimmunoglobulinemia D syndrome</i>
HPP	hydrolysats poussés de protéines
HPV	papillomavirus humain
HTA	hypertension artérielle
IDR	intradermoréaction
IHS	International Headache Society
ILMI	inégalité de longueur des membres inférieurs
IMC	indice de masse corporelle
IMC	infirmité motrice cérébrale
INVS	Institut national de veille sanitaire
IPLV	intolérance aux protéines du lait de vache
IPP	inhibiteurs de la pompe à protons
IRM	imagerie par résonance magnétique
IST	infection sexuellement transmissible
LCH	luxation congénitale de la hanche
MAPS	<i>mevalonate kinase associated periodic fever syndrome</i>
MC	molluscum contagiosum
MEOPA	mélange équimolaire d'oxygène et protoxyde d'azote
MICI	maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
MISP	médecin inspecteur de santé publique
OEAP	otoémissions acoustiques provoquées
OMA	otite moyenne aiguë
OMAP	otite moyenne aiguë purulente
OMS	Organisation mondiale de la santé
OSM	otite sérumuqueuse
PAI	projet d'accueil individualisé
PC	périmètre crânien
PCR	<i>polymerase chain reaction</i>
PCT	procalcitonine
PEA	potentiels évoqués auditifs
PFAPA	<i>periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenopathy</i>
PNA	pyélonéphrite aiguë
PNNS	Plan National Nutrition Santé
PT	toxine pertussique
QI	quotient intellectuel
RAA	<i>rhumatisme articulaire aigu</i>
REPOP	réseaux de prévention et prise en charge de l'obésité en pédiatrie
RGO	reflux gastro-œsophagien
ROC	réflexe d'orientation conditionné
ROC	réflexe oculocardiaque
RRO	rougeole-oreillons-rubéole
RVU	reflux vésico-urétéral
SAOS	syndrome d'apnées obstructives au cours du sommeil
SGA	streptocoque β -hémolytique du groupe A

SGT	syndrome de Gilles de la Tourette
SHOX	<i>short stature-homeobox</i>
SII	syndrome de l'intestin irritable
SLI	stimulation lumineuse intermittente
SRO	soluté de réhydratation orale
TAC	trouble de l'acquisition de la coordination
TAH	trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité
TDR	test de diagnostic rapide
TOC	trouble obsessionnel compulsif
TRAPS	<i>TNF receptor associated periodic syndrome</i>
TSSG	Tourette Syndrome Classification Study Group
UIV	urographie intraveineuse
UV	ultraviolets
VEMS	volume expiratoire maximal par seconde
VIH	virus de l'immunodéficience humaine
VRS	virus respiratoire syncytial
VZV	virus varicelle-zona

Avant-propos

Nous devons constamment remettre à jour nos connaissances et pratiques médicales, afin d'offrir à nos patients et à leurs parents la meilleure qualité d'écoute et de soins possible. La pédiatrie n'échappe pas à cette règle, qu'il s'agisse du dépistage, du repérage, de la prévention, de la prise en charge des pathologies qui émaillent la vie des enfants.

Cette dixième édition fournira au lecteur les éléments les plus récents pour l'aider dans sa pratique quotidienne.

Quoi qu'il en soit, certaines recommandations auront déjà peut-être évolué, c'est la raison pour laquelle nous avons cité tous les sites auxquels vous pouvez vous référer pour obtenir les informations essentielles récentes et validées.

Ce guide est, comme son nom l'indique, un « guide », et n'a pas la prétention d'être un traité de pédiatrie exhaustif. Nous avons privilégié la pathologie et les problèmes qui sont les plus souvent rencontrés ou évoqués par les parents en consultation.

Nous espérons qu'ainsi conçu, il vous sera utile dans ce merveilleux exercice qu'est la surveillance du développement global de l'enfant.

Jérôme Valleteau de Moulliac

Surveillance régulière de l'enfant

- La surveillance régulière est la base de la médecine préventive.
- À tout âge, il faut :
 - surveiller la croissance ;
 - surveiller les vaccinations ;
 - informer et éduquer les parents.
- Au premier âge, il faut surtout s'intéresser :
 - au développement psychomoteur ;
 - à l'alimentation ;
 - et dépister les handicaps.
- De 2 à 6 ans, à l'âge préscolaire, il faut s'assurer de la bonne intégration « sociale ».
- Surtout après 6 ans, il faut surveiller la scolarité, la vie sociale, affective, culturelle, etc.

La pédiatrie est médecine de développement : développement physique, intellectuel, affectif. Son but suprême est certes de soigner les enfants, mais aussi et surtout de contribuer à en faire des adultes normaux et correctement insérés dans la vie... Ambition démesurée peut-être, objectif à ne jamais perdre de vue néanmoins. C'est sur cette dimension, parfois un peu oubliée de la pédiatrie, que ce chapitre veut mettre l'accent.

Dans cette optique, la consultation régulière souvent effectuée à titre systématique est un acte d'une très grande portée. D'aucuns le considèrent comme de peu d'intérêt car de pure routine ; c'est dommage. Il est utile d'en souligner l'intérêt.

Surveillance régulière à tout âge

Nos études et la tradition nous ont enseigné qu'il fallait *surveiller la croissance, prévenir le rachitisme et vacciner les enfants*. Tels sont les actes essentiels qui ont longtemps constitué le cadre un peu négligé de la pédiatrie préventive. Ces trois points sont très importants, il est vrai, encore faut-il qu'ils soient correctement compris.

Surveiller la croissance staturale et pondérale

Si la surveillance de la croissance (dont les points de repère sont abordés au chapitre 19) est généralement très bien effectuée dans les 2 premières années

de la vie (les carnets de santé l'attestent), elle ne l'est pas toujours aussi bien après. Le médecin qui voit un enfant de petite taille à 8 ou 10 ans regrette bien souvent de ne pas posséder ces points de repère essentiels que sont la taille et le poids mesurés une à deux fois par an. Celui à qui est présenté un obèse à 12 ans regrette que cette surveillance régulière n'ait pas été réalisée avec suffisamment de vigilance pour que cette obésité ait pu être enrayée au moment où elle a démarré. Les petites tailles chez le garçon, les grandes tailles chez la fille, les surcharges pondérales auront d'autant plus de chances d'être prévenues, voire évitées, qu'elles auront été dépistées et surveillées précocement. Il paraît donc nécessaire de programmer une visite médicale semestrielle jusqu'à 4 ans, puis annuelle dans l'idéal jusqu'à la fin de la croissance pendant lesquelles entre autres sont mesurés poids et taille, permettant en plus de calculer l'indice de masse corporelle (IMC), si utile dans le dépistage de l'obésité et sa prévention précoce chez les sujets à risque (voir le chapitre 27) ; ces mesures doivent non seulement être notées dans le carnet de santé, mais aussi reportées sur les courbes qu'il contient, ainsi que dans le dossier médical du patient (de nombreux logiciels informatiques permettent même d'établir toutes les courbes automatiquement). Les médecins en sont certes convaincus ; qu'ils en convainquent les parents et leur enseignent que l'intérêt du carnet de santé ne s'arrête pas à la petite enfance.

Surveiller et contrôler l'alimentation de l'enfant

Cela est nécessaire afin de prévenir les carences, mais aussi et surtout l'obésité et les troubles du comportement alimentaire (voir le chapitre 4).

Prévenir le rachitisme

La prévention du rachitisme est de mieux en mieux effectuée en France, et son incidence diminue.

On oublie cependant trop souvent que les besoins en vitamine D sont liés à la vitesse de croissance staturale, que donc les âges à risque de carence correspondent aux périodes de croissance importante, soit essentiellement la petite enfance et la puberté.

Certes, les laits infantiles (préparations pour nourrissons, laits de suite, laits « Croissance », « Éveil », « Juniors » [de 1 à 3 ans]) sont enrichis en vitamine D, ce qui facilite beaucoup cette prévention, mais les quantités fixées par les normes européennes sont insuffisantes. Le lait de mère ne contient pas de vitamine D.

Il faut donc apporter de la vitamine D au nourrisson et ce d'autant qu'il est nourri au sein (1200 U/J), complètement ou partiellement, au biberon (400 à 80 U/J) et/ou qu'il a la peau noire, jusqu'à 2 ans.

Il est utile, surtout en milieu urbain, que l'enfant reçoive chaque année de la vitamine D, du moins jusqu'à 5 ans. Plutôt que de vains fortifiants réclamés par les parents, mieux vaut prescrire une dose de 80 000 ou 100 000 U de vitamine D, deux fois par an, séparées de 3 mois en période hivernale.

L'adolescence est une période à risque en ce qui concerne la minéralisation squelettique. On considère que le capital osseux est constitué à 16 ans chez la

filles, et à 18 ans chez le garçon, soit en fin de puberté. Il faut donc que le médecin s'assure à cet âge d'un bon apport calcique (souvent limité) et, surtout pour en faciliter l'absorption intestinale, d'un apport adapté en vitamine D afin d'obtenir le meilleur capital osseux possible, facteur de prévention à long terme de l'ostéoporose. Une dose hivernale de 200 000 U serait idéale.

Et pourquoi ne rien donner pendant cette phase de croissance régulière mais plus lente de 5 ans à la puberté ? Serait-il néfaste de donner, l'hiver, une dose de 80 000 ou 100 000 U ?

Vacciner les enfants

Les vaccinations sont, elles aussi, correctement effectuées, du moins pendant la petite enfance. Un chapitre entier de ce livre leur est consacré (voir le chapitre 5). Le rôle du médecin n'est pas seulement de vacciner pendant toute l'enfance, mais aussi d'expliquer le bien-fondé de ces vaccinations et de faire comprendre que le programme de vaccinations doit se poursuivre pendant toute la vie.

Prévenir la carie dentaire et les troubles de l'articulé dentaire

La santé buccodentaire de l'enfant doit faire partie des préoccupations du médecin au même titre que la croissance, le dépistage des troubles visuels ou auditifs, les difficultés scolaires, le développement psychomoteur, etc.

Prévention de la carie dentaire

La carie dentaire est une maladie bactérienne : les micro-organismes (notamment les streptocoques) métabolisent le saccharose déposé sur l'émail lors de l'alimentation et participent à la fabrication de la plaque dentaire, elle-même directement responsable de la formation de la carie.

Il existe trois moyens qu'il faut associer pour lutter contre la carie.

Diminution des glucides

La diminution des glucides dans la ration alimentaire implique notamment la diminution des bonbons et boissons sucrées, donc la suppression du grignotage et du biberon du soir chez le grand enfant.

Brossage régulier des dents

Le brossage régulier des dents après les repas – avec des brosses en soies synthétiques et souples, avec des mouvements tournants, en prenant son temps – serait certainement plus efficace s'il était pratiqué par les parents jusqu'à l'âge de 3, voire 6 ans (ou alors sous leur contrôle) et en utilisant des pâtes dentifrices fluorées (en petites quantités).

L'Afssaps (2008) recommande (mais est-ce réalisable ?) :

- de le débiter dès 6 mois (lors de l'apparition des premières dents) avec un dentifrice fluoré très peu dosé (< 500 ppm), en très petite quantité, une fois par jour ;
- puis, de 12 à 18 mois (molaires temporaires), d'utiliser une dose de dentifrice (< 500 ppm) de la taille d'un petit pois ;

- jusqu'à 3 ans, de les brosser deux fois par jour avec une pâte dosée à 500 ppm ;
- enfin, jusqu'à 6 ans, de les brosser trois fois par jour (pâte à 1000/1500 ppm de fluor).

Fluor

Le fluor est un excellent agent carioprophylactique ; en effet, en s'incorporant aux molécules constituant l'émail, il le rend plus résistant aux agressions bactériennes.

Certains pays ont choisi la fluorisation de l'eau de distribution. Ce n'est pas le cas de la France ; il faut donc administrer le fluor par voie générale. Ceci est si bien entré dans les habitudes qu'on commence à parler de *fluorose* (liée à un excès de fluor), ce qui provoque des controverses assez virulentes aux États-Unis et crée un malaise chez les prescripteurs ainsi que, parfois, des réticences dans les familles.

Le médecin doit donc personnaliser et adapter la prescription de fluor en tenant compte :

- de l'apport spontané par les sources naturelles que sont l'eau que l'enfant boit, que ce soit de l'eau de distribution ou de l'eau minérale, dont certaines sont très fluorées, surtout l'eau gazeuse ;
- du sel ingéré (contient-il du fluor ?) ;
- du dentifrice que l'enfant utilise, en particulier s'il en avale beaucoup (certains sont très riches en fluor) ;
- mais aussi du risque carieux.

Un enfant est à risque carieux élevé s'il présente un des facteurs de risque suivants :

- non-respect des règles d'hygiène alimentaire : notamment grignotage salé ou sucré, consommation de boissons type sodas en dehors des repas, prise d'aliments après le dîner ou au cours de la nuit ;
- endormissement avec un biberon contenant autre chose que de l'eau pure ;
- non-respect des règles d'hygiène buccodentaire : notamment brossage des dents absent, insuffisant ou inefficace, présence de tartre ;
- présence ou antécédents de caries chez l'enfant, les parents ou dans la fratrie.

Il existe également des facteurs de risque environnementaux dont il est indispensable de tenir compte pour apprécier le risque carieux d'un enfant :

- un niveau socioéconomique ou d'éducation faible de la famille ; une maladie ou un handicap de l'enfant entraînant des difficultés de brossage ;
- le port d'appareils d'orthodontie ;
- la prise au long cours de médicaments sucrés ou générant une hyposialie (exemple : médicaments anticholinergiques).

Le risque carieux varie en fonction de l'âge et de l'époque : les facteurs de risque carieux évoluent au cours de la vie. Le nombre et la forme clinique des lésions carieuses actives signent le risque carieux. Il doit donc être réévalué régulièrement par un praticien (au moins une fois par an chez les enfants à faible risque carieux, et au moins deux fois par an chez les enfants à risque carieux élevé).

Chez l'enfant à risque carieux élevé, des thérapeutiques fluorées systémiques et/ou topiques peuvent être prescrites et/ou appliquées en complément des mesures hygiénodétectives.

Fluor en gouttes ou comprimés

Toute prescription de supplémentation fluorée doit être précédée d'un bilan des apports fluorés mesurables (eau de boisson consommée, consommation de sel fluoré), car une seule source de fluorures par voie systémique doit être administrée.

Lorsque l'eau consommée a une teneur en fluor supérieure à 0,3 mg/l, les comprimés ou gouttes fluorés ne doivent pas être prescrits. Dans ce cas, il faut proscrire l'utilisation de cette eau pour la préparation des biberons des nourrissons, faire consommer de l'eau embouteillée ayant une teneur en fluor inférieure ou égale à 0,3 mg/l et supplémenter l'enfant. Quatre-vingt-cinq pour cent de la population française vit dans des communes où la teneur en fluor de l'eau de distribution est inférieure ou égale à 0,3 mg/l. Seulement 3 % des Français disposent d'une eau de distribution dont la teneur en fluor est supérieure ou égale à 0,7 mg/l (répartis dans quelques communes de huit départements : 02, 33, 37, 41, 47, 59, 77, 86).

Lorsque la famille utilise du sel de table fluoré, les comprimés ou gouttes fluorés ne doivent pas être prescrits.

La supplémentation en fluor peut commencer dès l'apparition des premières dents (environ 6 mois). La posologie recommandée est de 0,05 mg de fluor par kilo de poids corporel et par jour, sans dépasser 1 mg par jour tous apports fluorés confondus, afin d'éviter la survenue d'une fluorose.

Application de thérapeutiques topiques

Le chirurgien-dentiste jugera de la pertinence de proposer ce type de traitement.

Ce sont les vernis fluorés (dès que nécessaire, en denture temporaire comme en denture permanente) et les gels fluorés (pouvant être utilisés après l'âge de 6 ans). Ils peuvent être appliqués tous les 3 à 6 mois. L'utilisation de bains de bouche fluorés est possible pour les enfants capables de recracher (âgés de plus de 6 ans).

Prévention des troubles de l'articulé dentaire

C'est un réel problème quand on voit le nombre d'enfants ou d'adolescents porteurs d'appareils de correction. Les médecins devraient être sensibilisés à tous les facteurs qui peuvent perturber le développement normal des arcades dentaires et de la dentition.

Il faut insister auprès des parents sur l'importance de la mastication et réapprendre aux enfants à manger des aliments durs et croquants. La succion du pouce, des doigts ou de la tétine reste controversée. Doigts ou tétine ? Jusqu'à quel âge est-ce tolérable ? Il est évident que la succion n'améliore pas le développement de la mâchoire, mais peut-on toujours empêcher l'enfant de le faire ?

L'obstruction nasale et la respiration buccale qu'elle engendre peuvent entraîner des troubles de développement du massif facial. Il faut donc savoir demander un avis ORL.

Enfin, les problèmes de position de la langue dans la bouche, le type de déglutition primaire ou secondaire peuvent aussi jouer un rôle. L'orthophonie

peut alors apporter un début de solution. Voici différents éléments qu'il faut envisager dans la prévention des troubles de l'articulé dentaire.

Quoi qu'il en soit, il paraît cependant raisonnable de conduire un enfant régulièrement chez le dentiste à partir de l'âge de 3 ans ; celui-ci saura au mieux préciser les attitudes à adopter, et la fréquence des consultations.

Mesurer la pression artérielle, dépister l'hypertension artérielle

La mesure de la pression artérielle est difficile

Elle est recommandée au moins une fois par an après 3 ans.

L'état de relaxation de l'enfant d'un examen à l'autre est si variable que les chiffres mesurés sont parfois très différents. Il faut donc beaucoup de patience.

Les normes auxquelles on se réfère imposent une mesure chez un enfant allongé depuis au moins 5 minutes, avec un brassard adapté couvrant les deux tiers du bras (un brassard trop étroit augmente les valeurs mesurées), et par l'auscultation, afin d'obtenir les pressions systolique et diastolique (à la disparition des bruits).

Chez l'enfant de moins de 2 ans, les appareils type Dynmap™ sont indispensables, mais on peut se contenter de la technique du « flush ».


En pratique

- Chez le nouveau-né (1 mois) :
 - la pression artérielle systolique est de 80 mmHg (en moyenne) ;
 - la pression artérielle diastolique est de 50 mmHg (en moyenne).
- Les valeurs normales sont bien établies après 4 ans :
 - superposables dans les deux sexes jusqu'à la puberté ;
 - la pression artérielle augmente avec la taille plus qu'avec l'âge.
- Est excessive :
 - une pression artérielle supérieure à 95/65 mmHg chez un nouveau-né ;
 - une pression artérielle supérieure à 120/80 mmHg à tout âge.

Définition de l'hypertension artérielle

Les normes ont été fixées par le Club français de néphrologie pédiatrique en se référant aux courbes établies par André et al. en 1980 (figure 1.1) pour les enfants de 4 à 18 ans. La pression artérielle étant mieux corrélée à la taille qu'à l'âge, on se réfère donc aux valeurs normales en fonction du sexe et de la taille. Une pression artérielle est dite « normale » quand les chiffres de pression systolique et diastolique sont inférieurs au 90^e percentile pour la taille. Au-delà, on parle d'hypertension artérielle (HTA) :

- *limite* : quand les chiffres de PA systolique et/ou diastolique sont compris entre le 97,5^e percentile et le 97^e percentile + 10 mmHg ;

**Figure 1.1****Courbes de tension artérielle en fonction de la taille et du sexe.**

Tension artérielle en fonction de la taille – filles

Tension artérielle en fonction de la taille – garçons

Courbes utilisables chez les enfants de plus de 4 ans, tenant compte de la taille et non de l'âge.
 D'après André JL, Deschamps JP, Gueguen R. Tension artérielle chez l'enfant et l'adolescent. Arch Fr Pédiatrie 1980 ; 37 : 477-82.

- **confirmée ou sévère** : si ces chiffres sont supérieurs au 97,5^e percentile + 10 mmHg, à au moins trois mesures espacées de 1 à 4 semaines ;
- **menaçante (urgence)** : si les chiffres sont supérieurs au 97,5^e percentile + 30 mmHg.

Surveillance en fonction de l'âge**La période néonatale mérite une surveillance toute particulière**

Pendant le séjour en maternité, le médecin de famille a souvent le sentiment désagréable et frustrant que l'enfant et sa mère lui échappent, puisqu'ils sont généralement pris en charge par un confrère attaché à la maternité. Qu'il ne s'en formalise pas. Cette *médicalisation de plus en plus poussée de la période néonatale*, cette discipline nouvelle qu'est la néonatalogie ont leur raison d'être, tant cette période est semée de problèmes et d'embûches : c'est ainsi que peuvent être dépistés et traités très tôt certains handicaps (comme les cardiopathies congénitales à révélation néonatale, la luxation de la hanche, les anomalies des membres, les uropathies malformatives (souvent déjà dépistées

Index

γ-globulines

– varicelle, 231

17-OH-progestérone, 163

A

Abdomen

– douleurs, voir Douleurs abdominales

– échographie, 161, 178, 180

– météorisme, 132

– ondulations péristaltiques, 160

– radiographie, voir Radiographie de l'abdomen sans préparation

– tumeur, 182

Abouchement ectopique

de l'uretère, 345

Absentéisme scolaire, 31, 394

Accident(s)

– domestique(s), 29

– éducation des parents, 10

Accommodation, troubles, 304

Aciclovir, 280

Acide

– acétylsalicylique, voir Aspirine

– clavulanique, 246

– nalidixique, 298

Addis, compte, 234, 239

Adénite mésentérique, 180

Adénoïdectomie, 142, 218, 392

Adénopathie(s), 284

Adénophlegmons, 197

Adhérence préputiale, 347

Adjonctions obligatoires, 60

Adolescence, 10, 13, 16

– angoisse de la normalité, 14, 19

– apport de vitamine D, 3

– consultation

– – gynécologique, 20

– – règles fondamentales, 16

– diabète, 21

– épiphysiolyse, 255

– examen, 19

– information, 20

– maladie chronique, 21

– préadolescents, vaccination, 114

– scoliose, 256

– secret médical, 18, 20

– vaccination

– – contre l'hépatite B, 114

Adresses utiles, 461

Aérateurs transtympaniques, 220

Âge osseux, 323, 326, 330, 336, 338

Agents intraluminaux, 136

Agitation

– amblyope, 351

– handicap, 351

– hypoacousie, 351

– hystérie, 358

– psychomotrice, 29

– – constitutionnelle, 351

– – persistante, 350

AINS, 426

– antiprostaglandines, 182

– fièvre, 192, 193

Albuminémie, 137

Albuminurie

voir aussi Protéinurie

Albustix, voir Bandelettes réactives

Alimémazine, 360

Alimentation, 1

– allergie, 385

– au 1^{er} âge, 8

– forcing, 157, 171, 177, 182

– migraine, 299

– voir aussi Régime alimentaire

– voyages, 417

Allaitement artificiel

– avantages, 52

– choix du lait, 58

– inconvénients, 53

Allaitement maternel, 417

– alimentation, 49

– apport de vitamine D, 2

– avantages, 46

– constipation du nourrisson, 148

– contraception, 51

– contre-indications, 47

– diarrhée prandiale du nourrisson, 130

– durée, 52

– entérocolites non spécifiques, 141

– incidents pour la mère, 49

– incidents pour le bébé, 50

- inconvénients, 47
- sevrage, 52
- surveillance, 48
- Allaitement mixte, 52
- Allergie
 - alimentaire, 62, 385
 - aux protéines du lait de vache, 139
 - dermatite atopique, 273
 - pénicilline, 293
- Amaigrissement
 - déshydratation, 130
 - sténose du pylore, 160
 - voir aussi Courbe de poids
- Amblyopie, 275
 - dépistage, 9
- Amibiase, 140, 181
- Amoxicilline, 286
 - acide clavulanique, 246
- Ampicilline, 293
- Amygdalectomie, 218
- Amylasémie, 284
- Anafranil®, voir Clomipramine
- Analogue de la LH-RH, 331
- Androgènes, 324, 336
- Androstènedione, 163
- Anémie
 - à hématies falciformes, voir Drépanocytose
- anorexie, 169
- diarrhée chronique, 137
- rectorragies, 155
- Angine, 212, 285
- Angoisse
 - de l'adolescent, 14
 - scolaire, 402
- Anguillulose, 420
- Ankylostomiose, 418
- Anomalie
 - du développement staturopondéral, 392
 - maxillofaciale, 392
 - nasale, 392
 - oropharyngée, 392
- Anorchidie, 335
- Anorectite, 155
- Anorexie
 - diarrhée, 134
 - fièvre, 168
 - infection urinaire, 169
 - mentale, 22, 335
 - prévention, 170
 - psychogène, 171
- Anosmie, 336
- Antalgiques, 255, 285, 304
- Antétorsion fémorale exagérée, 260
- Antibiotiques, 286
 - diarrhée, 141
 - éruption, 293
- Anticonvulsivants, et fièvre, 194
- Anticorps
 - antigliadine, 138
- Antidépresseur, 303
- Antiépileptiques, 312, 385
- Antigène HBs, 114
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens, voir AINS
- Antipaludéens, 413
- Antipyrétiques, 255
 - AINS, 192
 - aspirine, 193, 263
 - paracétamol, 191
- Antitussifs, 231
- Antrite latente, 140
- Anus
 - fissure, 148, 151
 - sténose, 148
- Anxiété, 353, 402
- Apathie, 150
- Apnées obstructives du sommeil, syndrome, 391
- Appendicectomie, 180
- Appendicite, 132
 - aiguë, 158
 - subaiguë, 180
- Arachnodactylie, 332
- Arthralgie(s), 254
 - douleurs abdominales, 185
- Arthrite, 199
 - aiguë, 254, 263
 - chronique systémique, voir Still, maladie
 - *Haemophilus influenzae*, 113
- Articulé dentaire, 5
 - mastication, 5
- Ascaridiose, 179, 181
- Aspégic, voir Aspirine
- Aspirine, 255, 263, 426
 - allergie, 193
 - fièvre, 193, 194
 - toxicité, 193
- Assise, position, 27
- Association
 - des paralysés de France, 461
 - « Enfance maltraitée », 461
 - française des hémophiles, 461
 - « Grandir », 462
 - Vaincre la mucoviscidose, 461
- Asthme, 159
- Atrophie villositaire, intolérance au gluten, 138
- Attitude scoliotique, 256
- Audiogramme, 239
- Autisme
 - repérage, 35

Avlocardyl, *voir* Propranolol
 Axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, 324

B

Bacille
 – de Calmette et Guérin, *voir* BCG
 – pyocyanique, 133
 Bactériurie, 242
 Bandelettes réactives
 – glycémie, 318
 – hématurie, 233, 241
 – protéinurie, 233, 237
 BCG, vaccination, 110
 – dermatite atopique, 124
 Benzodiazépine, 360, 385
 Berger, maladie, 239
 Besoins
 – énergétiques, 45, 65, 75, 90
 – théoriques, 75, 100
 Bilan orthophonique, 179, 186, 393, 397, 458
 Bilharziose, 181, 419, 420
 Biopsie
 – intestinale, intolérance au gluten, 335
 – rectale, maladie de Hirschsprung, 148
 – rénale, 233, 235, 238
 BK, 110
 Boiterie(s), 253, 254, 255, 263, 358, 359
 – arthrite aiguë, 254
 – épiphysiolyse, 255
 – fébrile, 253, 263
 – infection ostéoarticulaire, 253, 263
 – ostéomyélite, 253, 263
 – psychogènes, 254
 – traumatique, 254
 Bradycardie, 150
 Bronchiolite, 223
 Bronchite, 159, 224, 309
 Bronchopneumonie, 283
 Brucellose, 199
 Brûlures rétrosternales, 184
 Bruxisme, 389

C

Calcémie, 162
 Calcifications intracrâniennes, 308
Campylobacter
 – diarrhée, 132
 – *jejuni*, 140
Candida albicans, 269
 Candidose, 269
 Cantines scolaires, 98
 Carbamazépine, 313

Cardiopathie(s), 329
 – congénitale, 9, 169
 – valvulaire, 205
 Carence, 100
 – diarrhée chronique, 137
 – martiale, *voir* Fer, carence
 Carie dentaire, prévention, 3
 Carnet
 – de santé, 2, 10, 127, 138, 319, 327
 – – introduction des farines, 138
 – – surveillance de la croissance, 2, 319
 – – vaccination, 127
 – – *voir aussi* Courbe de croissance, Courbe de poids
 – *énurésie*, 344
 Cartilage de conjugaison, 264
 Caryotype, 331
 Cauchemar, 387
 Cécité, 300
 Cellulite à *Haemophilus influenzae*, 113
 Céphalées, 176
 – algie vasculaire de la face, 302
 – chroniques, 297
 – critères de l'International Headache Society, 301
 – d'effort, 298
 – douleurs abdominales, 183
 – fièvre, 298
 – hématome extradural, 298
 – hématome sous-dural, 298, 303
 – HTA, 298
 – hypertension intracrânienne, 298, 303
 – intoxication aiguë, 298
 – malformation vasculaire cérébrale, 298
 – méningite, 297
 – migraine, 298, 305
 – récentes, 305
 – récidivantes, 305
 – sinusite, 298
 – traumatisme crânien, 298
 – tumeur intracrânienne, 297, 303
 – virose, 298
 – vomissements, 182, 298
 Certificats de santé du 9^e et du 24^e mois, 8
 Cervicovaginites, 246
 Cétose
 – de jeûne, 134
 – diabète de l'adolescent, 21
 Chambres d'inhalation, 232
 Chimio prophylaxie
 – paludisme, 420
 – scarlatine, 286
 Chimiothérapie, et puberté, 335
 Chirurgie
 – maladie de Hirschsprung, 148

- ORL courante, 218
 - urgences, vomissements et, 166
 - Chlore sudoral, dosage, 139
 - Chlorhydrate de tramadol, 428
 - Chloroquine, 414
 - Choc
 - hypertermie, 190
 - intolérance aux protéines du lait de vache, 139
 - Choléra, vaccination, 109
 - Cholestérolémie, 234
 - Chondrodystrophie, 329
 - Chromosomes, anomalies, 329, 331, 335
 - Chutes, 311
 - hystérie, 358
 - voir aussi Épilepsie Traumatismes
 - Cisapride, 153, 159
 - Classes primaires, 398
 - Classification de Tanner, 324
 - Clobazam, 388
 - Clomipramine, énurésie, 343
 - Coca-Cola®
 - diarrhée, 134
 - vomissements, 166
 - Colère, 372
 - Coliques du nourrisson, 61
 - Colite, 180
 - Colite ulcéreuse, 141
 - Côlon
 - irritable, syndrome, du nourrisson, 129
 - polype, 155
 - Colopathie bénigne du nourrisson, voir
 - Côlon irritable du nourrisson, syndrome
 - Colostomie, 148
 - Complément sérique, glomérulonéphrite, 239
 - Comportement, troubles, 9
 - Conduites addictives, 370
 - Confidentialité, et consultation de l'adolescent, 18, 20
 - Constipation, 61, 246, 347
 - banale, 150
 - diarrhée, 148
 - douleurs abdominales, 178
 - hypothyroïdie, 150
 - maladie de Hirschsprung, 150
 - Consultation de l'adolescent
 - gynécologique, 20
 - Contraception, 20
 - orale, et vaccination contre la rubéole, 109, 291
 - Convulsion(s)
 - EEG, 307, 308, 312
 - hyperpyrétique, 307, 309, 310
 - hypoglycémie, 311
 - méningite, 309, 311
 - vaccination, 311
 - versus épilepsie, 310, 312
 - – voir aussi Épilepsie
 - Convulsions(s)
 - état de mal convulsif, 190
 - Coproculture, indications, 132, 136, 141, 146
 - Coprolithe appendiculaire, 179
 - Coqueluche, 279
 - vaccination, 109, 115, 288
 - Corticoides
 - application cutanée, 273
 - varicelle, 280
 - Coup de chaleur, 418
 - Courbe
 - de croissance, 327, 329, 332
 - de poids
 - – diarrhée, 142, 144
 - – intolérance au gluten, 144
 - – sténose du pylore, 160
 - Créatininémie, 162, 170
 - Cri(s)
 - de joie, 28
 - rare et rauque, 150
 - Crise(s)
 - d'agitation, hystérie, 358
 - d'asthme, voir Asthme
 - d'épilepsie, 307, 315
 - de l'adolescence, 14
 - de nerfs, 307, 358
 - drépanocytaires, 185
 - Crohn, maladie, 141
 - Croissance, 1, 93
 - association « Grandir », 462
 - courbe, 329, 333
 - excès, 332
 - hormone, 324, 329
 - – déficit, 329
 - – hypersécrétion, 332
 - – synthétique, 331
 - retard, 327
 - – intra-utérin, 329, 332
 - CRP, 245, 458
 - douleurs abdominales, 178
 - Cryptorchidie, 336
 - Cycles artificiels, insuffisance gonadique, 335
 - Cycline, 298
 - Cystite, 180, 241, 347
 - Cystographie, 246, 345
 - Cystoscopie, 246
- D**
- Dantrium®, voir Dantrôle
 - Dantrôle, 304
 - Débilité, 350, 395
 - Déglutition, troubles, 150

- Démarche en rotation
 - externe, 260
 - interne, 260
- Déni de la maladie chronique, chez l'adolescent, 22
- Dents
 - carie, prévention, 3
 - infection, 201
 - plaque dentaire, 3
- Dénutrition, 140
- Dépakine[®], voir Valproate de sodium
- Dépistage
 - amblyopie, 9
 - anomalies des membres, 7
 - cardiopathies congénitales, 7, 9
 - HTA, 9
 - hypothyroïdie systématique, 150
 - luxation de la hanche, 9
 - strabisme, 9
 - surdit  , 9
 - uropathies malformatives, 7
- D  pression, 22, 355, 402
- D  rangement
 - rachidien, 258
- Dermatite atopique, 271
 - BCG, 124
 - complications, 272
 - vaccination, 124
- Dermatose(s), vaccination, 110
- Dermite
 - en W, 268
 - en Y, 269
- Dermocortico  ides, 274
 - ecz  ma, 274
- D  shydratation, 129
 - diarrh  e, 130
 - fi  vre, 192
 - risque, voir Risque de d  shydratation
- D  investissement scolaire, 401
- Desmopressine, 343
- Destrostix, voir Bandelettes r  actives
- D  veloppement
 - du langage, 9
 - psychomoteur, 1, 9
 -   tapes, 25
 - premier   ge, 8
- DHA (d  hydro  piandrosterone), 163
- Diab  te
 - et adolescence, 21
 - grossesse, 333
 - hypoglyc  mie, 311
 - insulinod  pendant, 311
 - macrosomie fo  tale, 333
- Diarrh  e
 - acide, 140
 - anorexie, 134
 - antibiotiques, 141
 - au retour d'un pays tropical, 132
 - carence martiale, 137
 - constipation, 148, 181
 - d  ficits immunitaires, 141
 -   ruption cutan  e, 131
 - fausse diarrh  e, 130
 - fi  vre, 129
 - glairosanglante, 129
 - graisseuse, 138
 - intol  rance, 139
 - nourrisson, 61, 137
 - otite, 131
 - parasitaire, 142
 - vomissements, 129, 134
 - voyages, 132, 136, 417
- Diaz  pam, 304
 - convulsions hyperpyr  tiques, 309
- Difficult  s scolaires, 31, 179, 186
- Digitaline, vomissements, 162
- Ditropan[®], voir Oxybutinine
- Diversification, 64
 - biscuits, pain, 72
 - eau, sel, sucre, 72
 - farine(s), 68
 - lait et produits laitiers, 67
 - l  gume(s) et fruit(s), 69
 - mati  re(s) grasse(s), 72
 - menus types, 74
 - viande, poisson,   uf(s), 71
- Diverticule de Meckel, 155, 180
- Doliprane[®], voir Parac  tamol
- Domp  ridone, 159
- Douleur(s)
 -    la d  f  cation, 150
 - abdominale(s)
 - causes psychologiques, 179, 185
 - c  phal  es, 182
 -   cole, 185
 -   pilepsie abdominale, 183
 - fonctionnelles, 175
 - gastrite, 183
 - invagination intestinale, 158
 - migraine, 183, 299, 300
 -   sophagite, 159, 184
 - p  riombilicale, 175, 185
 - tumeur abdominale, 184
 - ulc  re gastroduod  nal, 183
 - vomissements, 183
 - abdominale(s) chroniques et/ou r  cidivantes
 - ad  nite m  sent  rique, 180
 - constipation chronique, 178
 - dr  panocytose, 185
 - fi  vre, 179, 180, 185
 - forcing alimentaire, 182

- infection urinaire, 180
- intolérance au lactose, 185
- pâleur, 176
- parasitoses, 181
- péripubertaire, 182
- retour d'un séjour en pays tropical, 181
- syndrome du côlon irritable, 142
- aiguë, 429
- articulaires, voir Arthralgies
- de la hanche, 254
- évaluation de la douleur, 423
- faciale, 303
- lombaire, 241
- médicaments de la douleur, 425, 427, 428, 429
- antalgiques de palier I, 426
- antalgiques de palier II
- chlorhydrate de tramadol, 428
- codéine, 427
- nalbuphine, 428
- antalgiques de palier III
- morphine, 428
- autres médicaments de la douleur
- antispasmodiques, 428
- Emla[®], 429
- mictionnelles, 245
- orbitaire, 300, 303
- osseuse, 253
- périorbitaire, 303
- provoquées, 431
- uropathie, 180
- voir aussi Céphalées
- Drépanocytose, 185, 238
- Driptane[®], voir Oxybutinine
- Drogue
- Infos Service, 462
- voir aussi Toxicomanie
- Duodénum, sténose, 161
- Dysfonctionnement vésicosphinctérien, 345
- Dysgénésie gonadique, 335
- Dysménorrhée, 182
- Dyspepsie des farineux, 142
- Dysphagie, 197
- Dysplasie
- bronchopulmonaire, 227
- de hanche, 258, 261
- Dyspnée, 359
- Dyssomnies, 383
- Dyssynergie vésicosphinctérienne, 245
- E**
- Eau
- voyages, 417
- ECBU
- chez le nourrisson, 242
- protéinurie, 234, 237, 242
- ECG, malaise, 318
- Échec scolaire, 393, 394, 401
- Échographie, 238, 345
- abdominale
- douleurs abdominales, 178, 180
- sténose du pylore, 161
- de la hanche, 9, 252
- des voies urinaires
- infection urinaire, 345
- uropathie, 238, 345
- École
- angoisse, 185, 402
- douleurs abdominales, 185
- épilepsie, 313
- maternelle, 30
- primaire, 31, 398
- voir aussi Scolarité
- Ectopie testiculaire, 9
- Eczéma séborrhéique, 269
- Éducation des parents, 1
- EEG, 306
- convulsions, 306, 308
- malaises, 318
- Effort
- céphalées, 298
- malaises, 318
- pertes d'urine, 345
- protéinurie, 235
- Éjaculation, 326
- Électrocardiogramme, voir ECG
- Électroencéphalogramme, voir EEG
- Électrophorèse des protides, 234
- Empâtement lombaire, 241
- Encéphalite aiguë, 300, 311
- Encéphalopathie
- convulsivante, 309
- gigantisme, 332
- Endométriose, 182
- Enfant, 398, 400, 445, 446, 449
- épileptique, 311, 313, 314
- école, 313
- famille, 314
- sport, 314
- voir aussi Épilepsie
- gaucher, 396
- migrant, 443
- adolescence, 449
- école, 446
- santé, 445
- précoce
- surdoué, 398
- syndrome dit dyssynchrone, 400
- Entérobactéries, diarrhée, 133
- Entérocoques, diarrhée, 133

- Énurésie(s)
 - fausse énurésie, 345
 - secondaire, 339
 - sommeil, 341, 387
- Épiglottite, 113
- Épilepsie(s), 311, 358
 - abdominale, 183
 - école, 313
 - versus convulsions, 312
- Épiphysiolysse, 255, 264
- Épreuve(s)
 - d'orthostatisme, protéinurie, 235
 - urodynamiques, 246, 346
- Équivalents
 - migraineux, 300
- Éruption(s), 309
 - diarrhée, 131
 - médicaments, 282, 293
 - rougeole, 282
 - rubéole, 290
 - scarlatine, 285
 - varicelle, 279
 - virose, 293
 - voir aussi au nom des maladies virales
- Érysipèle, 267
- Érythème
 - facial, 303
 - fessier, 288
 - polymorphe bulleux, 292
- Érythrodermie, 269
- Érythromycine, 288
- Escherichia coli*
 - diarrhée, 132, 140
 - infection urinaire, 246
- Estradiol, 324
- Estrogène, 336
- Estroprogestatifs, 182
- État de mal convulsif, 190
- Étranglement herniaire, 158
- Examen, 361
 - cyto bactériologique urinaire, voir ECBU
- Examen(s)
 - complémentaires
 - diarrhée du nourrisson, 141, 144
 - en pédiatrie quotidienne, 458
 - fièvre inexpliquée, 456
 - interprétation, 459
 - parasitologique des selles, 133
- Exanthème subit, 292
- F**
- Farines
 - dyspepsie, 142
 - intolérance au gluten, 137
- Fatigue, 200, 452
- Faux asthme, 227
- Fécalome, 151, 154
- Fer, carence
 - diarrhée chronique, 137
- Fécalorragies, 156
- Fibroscopie
 - bronchique, 228
 - colique, 155
 - œsophagienne, 184
- Fièvre
 - AINS, 192, 193
 - anorexie, 168
 - anticonvulsivants, 194
 - arthrite, 254, 263
 - aspirine, 193, 194
 - bain, 191
 - boiterie, 263
 - céphalées, 297
 - chez le nouveau-né, 196
 - convulsion, 190, 308
 - dépassant
 - – 38, 5 °C, 189
 - – 41 °C, 190
 - diarrhée, 129
 - douleurs abdominales, 179, 180, 185
 - et éruption, voir Éruption et au nom des maladies infantiles éruptives
 - hématurie, 241
 - inexpliquée, examens complémentaires, 456
 - infection
 - dentaire, 201
 - ORL, 201
 - urinaire, 197, 201, 345
 - infection ORL, 197
 - isolée, 241
 - jaune, vaccination, 109, 406
 - médicaments contre la, voir Antipyrétiques et nom des médicaments
 - méningite, 195, 311
 - ostéomyélite, 253, 263
 - otite, 197
 - paracétamol, 191, 192
 - poussées, à répétition, 189
 - prolongée, 189
 - purpura, 195
 - refroidissement, 191
 - rougeole, 282
 - scarlatine, 285
 - typhoïde, voir Typhoïde, fièvre
- Filariose, 420
- Fissure anale, 148, 151
- Flunarizine, 302
- Fond d'œil, examen, 305, 308

Fontanelle

- dépression, 131
- tension, 195

Forcing

- alimentaire, 157, 161
- scolaire, 403

Fracture, 253

- en bois vert, 254

Fructose, 163

FSH, puberté, 324, 335, 336

Fugue, 369

- de l'école, 370

G

Galactosémie congénitale, 163

Gardénal, voir Phénobarbital

Gastrite, 183

Gaviscon[®], voir Pansements

œsophagiens

Genu

- valgum, 261
- varum, 262

GH (growth hormone), voir Croissance, hormone de

Gibbosité, 256

Gigantisme, 332

Globe vésical, 234

Globes oculaires

- hypotonie, 131

Glomérulonéphrite

- aiguë, 235
- avec dépôts mésangiaux, 238
- diffuse, 238

Gluten, intolérance, 334

Glycémie, 318

Gonades

- absence, 335
- insuffisance, 335
- puberté, 324

Goût, 88

Graphisme, 30, 396

Greulich et Pyle, atlas, 320

Grippe, vaccination, 119

Grossesse

- diabète, 333
- vaccination, 110

Guthrie, test, 150

Gynécomastie pubertaire, chez le garçon, 326

H*Haemophilus*

- méningites, 113, 406
- vaccination, 104, 109, 113

Halfan, voir Halofantrine

Halofantrine, 415

Halopéridol, tics, 364

Hanche

- douleur, 254
- dysplasie, 258, 261
- échographie, 9, 252
- luxation
 - – dépistage, 9, 251
 - – malposition des pieds, 249
- rhume, 430

Handicap

- adresses utiles, 461
- agitation, 351
- hCG, sécrétion tumorale, 337

Helicobacter pylori, 183

Hématome

- extradural, 162, 298
- sous-dural, 162, 298
- Hématurie(s), 179, 180, 233, 235
- bilharziose, 238
- drépanocytose, 238
- fébrile, 241
- glomérulonéphrite aiguë, 238
- infection urinaire, 245
- kyste du rein, 238
- lenticône, 239
- lithiasse, 238
- maladie de Berger, 239
- maladie hémorragique, 238
- protéinurie, 234, 236, 238
- surdité, 239
- tumeur rénale, 238
- uropathie, 238

Hémicrânie, 299, 303

Hémiplégie, 310

- migraine, 299

- récidivante, 300

Hémodialyse, et vaccination contre l'hépatite B, 114

Hémolyse, 185

Hémopathie, 199

Hémophilie, 114

- Association française des hémophiles, 461

Hémorragie

- méningée, 300

Hépatite

- A, vaccination, 109
- B, vaccination, 20, 109, 114, 406

Hernie

- de l'ovaire, 335

- étranglée, 158

Holter, enregistrement cardiaque

318

Hormone, voir au nom des hormones

HTA
 – céphalée, 298
 – définition, 6
 – dépistage, 6, 9
 – poussée, 311
 – protéinurie, 235, 238
 Huile de paraffine, 150
 Hydantoïne, 385
 Hydrogène expiré, test, 140
 Hydrolysats poussés de protéines, 56, 134
 Hygiène
 – diarrhées, 405
 – voyages, 405, 417
 Hymen, imperforation, 182
 Hyperactivité associée à un trouble déficitaire de l'attention, 351
 Hyperandrogénie, 333
 Hypercalcémie, 162
 Hypercholestérolémie, 234
 Hypercorticisme, 329
 Hyperéosinophilie, 181, 419
 Hyperestrogénie, 333
 Hyperplasie congénitale des surrénales, 162
 Hypersomnie, 390
 Hypertension, 6
 – artérielle, 247
 – artérielle, *voir* HTA
 – intracrânienne, 298
 Hyperthermie
 – majeure, syndrome, 190
 – maligne, 418
 Hyperthyroïdie, 333
 Hypertrophie
 – adénoïdoamygdalienne, 392
 – viscérale, 332
 Hypoacousie
 – agitation, 351
 – difficultés scolaires, 395
 Hypocalcémie, 311
 Hypoglycémie
 – convulsions, 311
 – de l'adolescent, 21
 – diabète, 311
 Hypophyse
 – hypersécrétion d'hormone de croissance, 332
 – insuffisance hypophysaire, 327
 – puberté, 324, 335, 337
 Hypoprotidémie
 – diarrhée chronique, 137
 – protéinurie, 234
 Hypothalamus, puberté, 324, 337
 Hypothermie, 150, 241
 Hypotonie, 150
 – des globes oculaires, 131

– musculoligamentaire, 260
 Hystérie, 349

I

Ibuprofène, 192, 193
 Ictère traînant, 241
 Identité de l'adolescent, 14
 Imagerie par résonance magnétique, *voir* IRM
 Imipramine, 343
 Immaturité vésicale, 245, 346
 Immunodépression
 – varicelle, 280
 Immunoglobulines, injection, et vaccination, 110
 Imperforation hyménéale, 182
 Impétigo, 265
 Incontinence urinaire, 345
 Infection(s)
 – anorexie, 168
 – boiterie, 253
 – diarrhée, 131, 140
 – douleurs abdominales, 180
 – fièvre, 201
 – ORL, 197, 201
 – – à répétition, 142
 – ostéoarticulaire, 254
 – respiratoire(s)
 – – à répétition, 138, 159
 – sévère, 195
 – urinaire(s), 201
 – – anomalie de la jonction pyélo-urétérale, 243
 – – chez le nourrisson, 189
 – – cystite, 241
 – – diarrhée, 131, 241
 – – du nourrisson, 169, 236, 241
 – – du nouveau-né, 241
 – – fièvre, 197, 241
 – – hématurie, 238, 245
 – – hypothermie, 241
 – – lithiase urinaire, 243
 – – protéinurie, 234
 – – pyélonéphrite, 241
 – – reflux vésico-urétéro-pyélique, 243
 – – septicémie, 241
 – – uropathie, 233, 243, 245, 345
 – – vessie neurologique, 245
 – – vomissements, 158, 241
 – virales, *voir* Viroses
 – *voir aussi* au nom des maladies et des agents infectieux
 Inhibiteur, 274
 – de la calcineurine (IC)

- eczéma, 274
- de la pompe à protons, 159
- Insomnie, 384, 389
- Instabilité
- psychomotrice, 29
- Insuffisance, 235, 239, 327
 - cardiaque, vomissements, 162
 - hépatocellulaire néonatale, 163
 - hypophysaire, 335
 - partielle, croissance, 327
 - pancréatique externe, 138
 - rénale, 169, 329, 334
 - protéinurie, 235, 239
 - respiratoire chronique, 334
- Internet, 376
- Intervalle libre
- céphalées, hématome sous- ou extradural, 298
- hyperplasie congénitale des surrénales, 162
- sténose du pylore, 160
- vomissements, hématome sous- ou extradural, 298
- Intolérance
- au fructose, 163
- au gluten, 138
- au lactose, 185
- aux protéines du lait de vache, 139
- médicamenteuse, 293
- Intoxication
- médicamenteuse, 311
- par l'oxyde de carbone, 298
- Invagination intestinale aiguë, 132
- Ionogramme, 163
- IRM, cérébrale, 182, 306, 308, 311, 346

J

- Jambes arquées, 262
- Jeux, 373
 - vidéo, 375, 376
- Jonction pyélo-urétérale, malformation, 243
- Jouets, 373

K

- Kala-azar, 420
- Kaposi-Juliusberg, pustulose disséminée, 272
- Kawasaki, maladie, 200
- Kétoprofène, 193
- Kinésithérapie respiratoire, 223
- Klebsielles, diarrhée, 133
- Koch, bacille de, voir BK

Kyste

- bronchogénique, 227
- du rein, 238

L

- Lactose, intolérance, 185
- Lait(s)
 - 1^{er} et 2^e âges, 2
 - changements, 144
 - enrichis en pré- ou en probiotiques, 57
 - réintroduction après diarrhée, 134
 - vitamine D, 2
- Lambliales, 140
- Langage
 - décalage entre l'activité motrice et le langage, 350
 - développement, 9, 29
 - trouble, 396
- Larmolement, 303
- Laryngite, 159, 197
- Lavement baryté, maladie de Hirschsprung, 148
- Lecture, 31
- Legg-Perthes-Calvé, maladie, voir Ostéochondrite de la tête fémorale
- Leiner-Moussous, maladie, 269
- Lenticône, 239
- Leucocyturie, 237, 242
- Lèvre, angiome, 275
- LH, puberté, 324, 336
- LH-RH
 - analogues, 331
 - puberté, 324
- Lipidémie, 234
- Lipothymie, 307
- Lithiase
 - urinaire, 180, 238, 243
 - vésiculaire, 185
- Lopéramide, 135
- Lupus érythémateux disséminé, 199
- Luxation, 9
 - de la hanche, 249
 - – dépistage, 9
 - du cristallin, 332
- Lymphangiectasies intestinales, 141

M

- Macroglossie, 150, 332
- Macrolides, 286, 288
 - dérivés de l'ergotamine, 302
- Macrosomie fœtale, 333
- Maigreux, 335
- Malabsorption
 - digestive, 169, 329

Maladie(s)

- chroniques, et adolescence, 21
- cœliaque, *voir* Gluten, intolérance
- inflammatoires, 199
- – intestinales, 141
- sexuellement transmissibles, prévention, *voir aussi* au nom des maladies
- systémiques, 199
- Malaise(s), 159, 307
- d'effort, 318
- graves du nourrisson
- reflux gastro-œsophagien, 159
- vagal, 317
- Malarone, 414
- Malformations
- des voies urinaires
- – infection urinaire, 233, 238
- – jonction pyélo-urétérale, 243
- multiples, 335
- vasculaire cérébrale, 298
- Malpositions des pieds, 9
- Manométrie anorectale, 148
- Marche, 28, 253, 259
- Maturation
- neurologique, et propreté, 372
- osseuse, *voir* Âge osseux
- Meckel, diverticule, 155, 180
- Méconium, retard à l'évacuation du, 148
- Médicaments
- allergie, 192, 293
- diarrhée, 135
- éducation des parents, 10
- éruptions, 282, 293
- hypertension intracrânienne, 298
- intoxication, 311
- vomissements, 162
- Médroxyprogestérone, 182
- Méfloquine, 414
- Mégalérythème épidémique, 292
- Membres, anomalies, dépistage, 7
- Méningite
- céphalées, 297
- convulsions, 309, 311
- fièvre, 195, 311
- *Haemophilus influenzae*, 113, 406
- vomissements, 158, 164
- Méningoencéphalite, 309
- Mensonge, 367
- Méprobamate, 385
- Mérycisme, 162
- Mésentère commun, 161
- Metatarsus varus, 249, 264
- Météorisme abdominal, 132
- Métoclopramide, 159, 302
- Micropénis, 336

Miction(s)

- douleurs, 245
- impérieuses, 245
- Migraine, 183, 297
- avec troubles de la conscience, 300
- basilaire, 300
- équivalents, 300
- hémiplégique, 299
- ophtalmoplégique, 300
- Molluscum contagiosum, 270
- Monoarthrites, 254
- Motilium, *voir* Domperidone
- Motricité colique, modificateurs, 153
- Moustiques, piqûres, 415, 419
- Mucoviscidose, 138
- Muguet buccal, 269
- Mycose, 269
- Myiases, 418

N

- Nævus, 276
- Nausées
- voir aussi* Vomissements
- Néophobie, 88
- Néphropathie
- protéinurie, 234, 236
- *voir aussi* Syndrome néphrotique
- vomissements, 162
- Neuroleptique, 360
- Nez
- lavage au sérum physiologique, 204
- obstruction, 385
- NFS
- anorexie, 170
- diarrhée chronique, 137
- douleurs abdominales, 179
- Normalité, angoisse de la, et adolescence, 14, 19
- Nourrisson, 61, 159
- appendicite aiguë, 158
- côlon irritable, syndrome, 129
- coqueluche, 287
- déshydratation, 130
- diarrhée
- – aiguë, 61
- diarrhée chronique, 137
- enregistrement Holter, cardiaque, 318
- fièvre
- – risques, 189
- infection urinaire, 169, 189, 236, 242
- malaise grave
- – reflux gastro-œsophagien, 159
- malaise vagal, 317
- occlusion, 148, 158
- protéinurie, 236

- scoliose, 255
- soleil et peau, 265
- vomissements, 139, 157
- Nouveau-né, 26
- constipation, 148
- dépistage de l'hypothyroïdie, 150
- fièvre, 196
- infections urinaires, 242
- mère diabétique, 333
- mère porteuse de l'antigène HBs, 114
- occlusion, 148
- Numération globulaire formule sanguine, voir NFS
- Nutrition
- puberté, 323
- voir aussi Alimentation

O

- Obésité, 333, 392
- cause, 435
- clinique, 434
- complications, 435
- facteurs environnementaux, 434
- facteurs génétiques, 433
- prévention, 439
- – dépistages, 442
- – mesures éducatives, 442
- traitements, 437, 438
- Obstruction nasale, 385
- Occlusion(s) intestinale(s)
- à répétition, 161
- néonatale, 148
- Œdème(s)
- papillaire, 305
- protéinurie, 234
- Œil
- céphalée, 303, 305
- migraine, 300
- poursuite oculaire, 26
- Œsophage
- œsophagite, 159, 184
- Oligurie, protéinurie, 238
- Omphalocèle, 332
- OMS, objectifs vaccinaux, 103
- Ondulations péristaltiques, 160
- Ophtalmoplégie, migraine, 300
- Opposition, 29, 350, 372
- Orchite ourlienne, 285
- Ordinateur, 376
- Oreillons
- vaccination, 109, 285
- ORL, 142, 197, 201
- chirurgie courante, 203
- infection(s)
- – à répétition, 142

- – antibiotique, 203
- – fièvre, 197, 201
- problèmes courants, 203
- Orthophoniste, 179, 186, 396, 397, 458
- Orthostatisme
- pertes d'urine, 345
- protéinurie, 236
- Ortolani, manœuvre, 252
- Os
- âge, voir Âge osseux
- fracture, 253
- infection, 253, 263
- scintigraphie, 254
- tumeur, 253
- Ostéochondrite, 258
- Ostéochondrose, 255
- Ostéomyélite, 253, 263
- Ostéoporose, prévention, 3
- Otite, 159, 205
- diarrhée, 131
- fièvre, 197
- Ovaire(s)
- hernie, 335
- torsion, 335
- tumeur, 182
- Oxybutinine, 346
- Oxyde de carbone, intoxication, 298
- Oxyurose, 153, 179, 181, 246

P

- Pâleur, 169
- douleurs abdominales, 176
- fièvre, 195
- malaise vagal, 317
- voir aussi Anémie
- Paludisme, 405, 420
- Pansements œsophagiens, 159
- Paracétamol, 255, 426
- fièvre, 191, 192
- Paralysie du III, migraine, 300
- Parasitoses
- diarrhée, 133, 140
- douleurs abdominales, 181
- Parasomnies, 386
- Parents, éducation, 1, 170
- Paupière
- angiome, 275
- œdème unilatéral, 211
- Peau
- pli cutané, 130
- soleil, 265
- Pédiculoses, 266
- Pénicilline
- allergie, 293

- Pénis, développement, 326
– micropénis, 336
Périartérite noueuse, 199
Périmètre crânien, 165
Perte(s)
– d'urine, 345
– – voir aussi Enurésie
– de sel, 163
Petite taille, 2, 329
– voir aussi Croissance
pH œsophagien, 159
Pharyngite, 131
Phénobarbital, 313, 385
Phimosis, 245
Phobie scolaire, 402
Pied(s)
– bot varus équin, 249, 263
– convexe congénital, 249
– creux, 259
– malpositions, 9
– *metatarsus varus*, 249
– plat, 258
– qui « tourne », 260
– talus, 250
Pilosité, développement, 324, 325
– prématuré, 326, 338
Pilule, voir Contraception orale
Pipi-stop, 344
Pizotifène, 302
Plasmodium
– *falciparum*, 413, 420
– *vivax*, 420
Pleurs, au départ de la mère, 28
Plicature gastrique, 161
Pneumocoque
– vaccination, 109
Pneumonie, 224
Pneumopathie(s)
– à répétition, 159
– *Haemophilus influenzae*, 113
Poids, courbe, 321
– diarrhée, 142
– sténose du pylore, 160
– voir aussi Amaigrissement, Maigreux, Obésité
Poliomyélite
– vaccination, 406
Pollakiurie, 245
Polydipsie, et polyurie, 162
Polype(s), 155
Polyurie, et polydipsie, 162
Ponction
– lombaire, 158, 297, 311
– vésicale sus-pubienne, 242
Position
– assise, 27
– debout, 27
Préadolescents, vaccination, 114
Préalbunémie, 137
Préhension des objets, 28
Prélèvement
– de gorge, 285
Prématurité
– vaccination, 110
Prépuberté, 320
Prépuce, adhérence, 347
Préservatif, 20
Pression artérielle
– mesure, 6
Prévention
– carie dentaire, 3
– de l'anorexie, 170
– de l'obésité, 87
– de l'ostéoporose, 3
– des accidents domestiques, 9, 29
– des allergies alimentaires, 86
– des maladies contagieuses, 279
– des maladies de l'adulte, 85
– des maladies sexuellement transmissibles, 20
– du rachitisme, 2, 263
– du sida, 20, 462
Priméran[®], voir Métoclopramide
Probiotiques, 135
Produit(s) ménager(s), 29
Progestérone, 324
Proguanil, 414
Prokinétiques, 153, 159
Prométhazine, 192
Propranolol
– algie vasculaire de la face, 303
– migraine, 302
Propreté
– apprentissage, 371
– diurne, 339
– nocturne, 339
Protéine(s), 5
– C réactive, voir CRP, 139, 178, 196, 223, 242, 253, 452, 458
– du lait de vache
– – intolérance, 139
Protéinurie
– bandelettes réactives, 237
– chez le nourrisson, 236
– d'effort, 235
– dosage pondéral sur 24 heures, 234, 237
– glomérulonéphrite aiguë
– – subaiguë, 234
– hématurie, 234

- HTA, 235, 238
- hypoprotidémie, 234
- infection urinaire, 234, 242
- insuffisance rénale, 235
- isolée, 235
- néphropathie, 234, 235
- nourrisson, 236
- œdèmes, 234
- oligurie, 238
- orthostatique, 235, 237
- permanente, 236
- sport, 235
- syndrome néphrotique, 235
- transitoire, 235
- vaccination, 236
- Proteus*
 - diarrhée, 133
 - infection urinaire, 246
- Protidémie, 234
- Prurigo, 267
- strophulus, 268
- Psychiatrie, adolescence, 22
- Psychothérapie, 303, 305, 345, 386
- Puberté, 10, 13
 - chez la fille, 324
 - chez le garçon, 325
 - chimiothérapie, 335
 - croissance, 319
 - différée, 330
 - dissociée, 326
 - douleurs abdominales, 182
 - freinage, 331
 - nutrition, 323
 - précoce, 333
 - centrale, 337
 - partielle, 338
 - périphérique, 337
 - pseudopuberté précoce, 337
 - radiothérapie, 335
 - variantes de la normale, 326
- Punition, 371
- Purpura, fièvre, 195
- Pyélonéphrite, 241
- Pylore, sténose, 148
- Pylorotomie extramuqueuse, 161
- Pyocyanique, bacille, 133

Q

Quinte, coqueluche, asphyxiante, 286

R

- Racécadotril, 135
- Rachitisme, 262
- Radiographie
 - de l'abdomen sans préparation
 - – douleurs abdominales, 178
 - – encoprésie, 154
 - – maladie de Hirschsprung, 148
 - – uropathie, 238
 - des membres inférieurs, 262
 - du bassin, 261, 458
 - – dépitage de la luxation de la hanche, 9, 252
 - – ostéochondrite de la tête fémorale, 255
 - du poignet et de la main gauche, 320
 - du rachis, scoliose, 256
 - thoracique, 144, 458
 - Radiothérapie, et puberté, 335
 - Rage, vaccination, 109
 - Rectite, 155
 - Rectoscopie, 155
 - Rectum, 155
 - Redoublement, 186
 - Rééducation
 - orthophonique, 186, 396
 - scoliose, 256, 257
 - Réflexe(s) archaïque(s), 26
 - Réfraction, troubles, 304
 - Refroidissement, et fièvre, 191
 - Régime alimentaire
 - antidiarrhéique, 135
 - erreurs
 - – constipation, 149
 - – diarrhée, 140
 - – vomissements, 157
 - hypocalorique, prolongé, 141
 - hypoprotidique, prolongé, 141
 - sans gluten, 138, 334
 - sans protéines du lait, 139
 - voir aussi Alimentation
 - Règles
 - apparition, 325
 - douleurs, 179, 182
 - Régurgitation(s) simple(s), 63
 - Réhydratation du nourrisson
 - fièvre, 191
 - solutions, 413
 - Rein
 - biopsie, 233, 235, 238
 - tumeur, 238
 - Repérage
 - autisme, 35
 - des déficits auditifs, 40, 38
 - des déficits visuels, 40
 - des troubles du langage, 35
 - TDAH, 37
 - Ressaut, signe, 252
 - Retard, 64, 334
 - à l'évacuation du méconium, 148
 - de croissance, voir Croissance, retard
 - de l'âge osseux, 330

- de vaccination, 123
- pubertaire, *voir* Puberté, retard
- Rétention menstruelle, 182
- Rhinopharyngite(s), 169, 203
- diarrhée, 131, 142
- vomissements, 159
- Rhume, 197
- de hanche, 254
- Risque(s)
- de convulsion hyperpyrétique, 309
- suicidaire, 22
- Ronflement, 391
- Roséole, *voir* Exanthème subit
- Rotavirus, diarrhée, 131, 140
- Rougeole
- vaccination, 109
- RRO, vaccination, *voir* Rougeole, Oreillons,
- Rubéole, vaccination
- Rubéole
- contraception, 291
- vaccination, 109, 291
- Rythmes scolaires, 403
- Rythmie du sommeil, 389

S

- Salmonelles, 132, 136, 140
- Sanmigran, *voir* Pizotifène
- Santé buccodentaire, 88
- Scanner, *voir* Tomodensitométrie
- Scintigraphie
- au technétium, diverticule de Meckel, 155
- osseuse, 254
- Scolarité, 1, 9
- absentéisme, 31, 394
- angoisse, 402
- anxiété, 186
- difficulté, 185
- difficultés, 31, 179
- échec, 394, 401
- forcing, 403
- phobie, 402
- rythmes, 403
- *voir aussi* École
- Scoliose
- attitude scoliotique, 256
- Scotome scintillant, 299
- Secret médical, et consultation de l'adolescent, 18, 20
- Seins, développement, 325
- prématuré, 326, 338
- Septicémie, 136
- entérocolites non spécifiques graves, 140
- infection urinaire, 241

- Sérologie, *voir* au nom des affections
- Sérum physiologique
- lavage du nez, 204
- Sésamoïde du pouce, apparition, 323
- Sexualité de l'adolescent, 13
- Shigelles, 132, 140
- Sibélium, *voir* Flunarizine
- Sida
- Infos Service, 462
- prévention, 20
- vaccination, 110
- Sinusite, 159, 209
- frontale, 298
- maxillaire, 298
- Sirops, contenu en paracétamol, 192
- Soleil et peau, 265
- Solutés de réhydratation, 133
- Sommeil
- énurésie, 341, 387
- rythmie, 388
- syndrome d'apnées obstructives, 391
- troubles, 351
- Somnambulisme, 388
- Somniloquie, 388
- Sourire, 26
- Spasme du sanglot, 307, 316
- Spina bifida, 346
- Sport
- de haut niveau, et puberté, 335
- épilepsie, 314
- malaises, 318
- protéinurie, 236
- Staphylocoque
- diarrhée, 133
- infection cutanée, 266
- Sténose
- anale, 148
- du pyllore, 148
- duodénale, 161
- Still, maladie, 199
- Strabisme, dépistage, 9
- Streptocoque
- infection cutanée, 266
- Stress, 186
- Succion, troubles, 150
- Sueur, test de la, mucoviscidose, 139
- Suicide, risque, *voir* Risque suicidaire
- Sumatriptan, 302
- Surdit , 239
- dépistage, 9
- Surrénales
- hyperplasie congénitale, 162, 337
- tumeur, 337
- Surveillance
- de la croissance, 1, 320
- obligatoire, 8

- Sympathome, 141
- Syndrome(s)
 - d'Alport, 239
 - d'apnées obstructives du sommeil, 391
 - de Blount, 263
 - de Claude Bernard-Horner, 303
 - de Klippel-Trenaunay, 275
 - de Kleine-Levin, 390
 - de Marfan, 332
 - de Wiedemann-Beckwith, 332
 - de Sturge-Weber, 275
 - dit « de pénétration », 228
 - néphrotique, 234
 - pied-main-bouche, 292

T

- Tænia, 181
- Taille
 - courbes, 320
 - gain pubertaire, 320
 - grande
 - – constitutionnelle, 333
 - petite, 2
 - – constitutionnelle, 331
 - voir aussi Croissance
- Tanner, classification, 324
- TDAH, 400
 - repérage, 37
- Télévision, 374
- Température, 190
- Terreurs nocturnes, 387
- Test(s)
 - à l'hydrogène expiré, 140
 - de Guthrie, 150
 - de la sueur, mucoviscidose, 139
 - orthophoniques, 179, 186, 393, 396, 397, 458
 - psychométriques, 179, 186, 393, 395, 458
- Testicule
 - développement, 324, 325
 - torsion, 335
 - tumeur, 335
- Testostérone, 163, 324
 - insuffisance gonadique, 335
- Tétanos, vaccination, 406
- Tête, tonus, 26
- Théophylline, vomissements, 162
- Thermopathomimie, 349, 360
- Tibia, fracture, 254
- Tics, 349, 362
- TOC, 365
- Tofranil[®], voir Imipramine
- Tomodensitométrie cérébrale
 - céphalées, 306
 - convulsions, 308, 311
 - traumatisme crânien, 298

- Topaal[®], voir Pansements œsophagiens
- Torsion
 - d'ovaire, 335
 - du squelette jambier, 260
 - du testicule, 335
- Toucher rectal, 154
- Toux, 197
 - céphalées, 303
 - chronique, 226
 - coqueluche, 286
 - médicaments contre la, voir Antitussifs
 - reflux gastro-œsophagien, 159
- Toxicomanie
 - adresses utiles, 462
 - vaccination contre l'hépatite B, 114
- Traumatisme, 298
 - boiterie, 253, 263
 - crânien
 - – céphalées, 298
 - – hématome extra- ou sous-dural, 298
 - fracture, 253
- Trimébutine, 153
- Trouble(s)
 - des apprentissages, 352
 - du langage, 34
 - obsessionnels compulsifs, voir TOC
- Trypanosomiase, 420
- Tuberculose, 199
- Tumeur
 - abdominale, 184
 - céphalées, 297
 - cérébrale, 182
 - osseuse, 253
 - ovarienne, 182
 - rénale, 238
 - surrénalienne, 337
 - testiculaire, 337
- Turner, syndrome, 331, 332, 335
- Typhoïde, fièvre, 418
 - vaccination, 199

U

- UIV, 246, 345
- Ulcération thermométrique, 155
- Ulcère gastroduodénal, 183
- Union nationale des associations de parents et d'enfants inadaptés, 461
- Urée sanguine, 162, 170, 234
- Urètre
 - abouchement ectopique, 345
 - malformation, 243
 - méga-urètre, 243
 - urétérocele, 243
- Urètre, valve, 243, 245
- Urétrite, 347

Urine, 346
 – incontinence, 345
 – infection, voir ECBU, Infection urinaire
 – perte, 339, 345
 – – voir aussi Énurésie
 – rouge, 237
 Urodynamiques, épreuves, 246, 346
 Urographie intraveineuse, voir UIV
 Uropathie(s)
 – douleurs abdominales, 180
 – fièvre, 197
 – hématurie, 238
 – infection urinaire, 233, 243, 245, 345
 – malformatives, voir Malformations des voies urinaires

V

Vaccin
 – antigrippal, 119
 Vaccination(s), 1, 3, 103, 120
 – allergie, 124
 – anti-*Haemophilus b*, 112
 – antigrippale, 119
 – antipneumococcique, 116
 – calendrier, 104
 – carnet de santé, 127
 – contre *Haemophilus b*, 109, 406
 – contre l'hépatite B, 20, 109, 114, 406
 – contre la coqueluche, 115, 288, 406
 – contre la diphtérie, 406
 – contre la fièvre jaune, 109, 123, 406
 – contre la poliomyélite, 109, 406
 – contre la rougeole, 109, 406
 – contre la rubéole, 109, 290, 406
 – contre la typhoïde, 109
 – contre la varicelle, 118
 – contre le choléra, 123
 – contre le méningocoque A et C, 123
 – contre le tétanos, 406
 – contre les oreillons, 109, 124, 285, 406
 – convulsions, 311
 – corticoïdes, 125
 – dermatite atopique, 124
 – fausses contre-indications, 125
 – fièvre, 125
 – grossesse, 109, 110
 – immunodépression, 109
 – injection d'immunoglobulines, 109, 110
 – par le BCG, 406
 – pénétration, 126
 – préadolescents, 114
 – protéinurie, 236
 – refus, 126
 – retard de, 123
 – voies, 124
 – voyages, 114, 405, 406
 Valium[®], voir Diazépam
 Valproate de sodium, 310, 313
 Valve urétrale, 245
 Variantes de la normale, puberté, 326
 Varicelle
 – immunodépression, 281
 Vascularite, 199
 Vessie
 – immature, 245, 346
 – neurologique, 245
 Virilisation, 163
 Viroses
 – diarrhée, 131
 – éruptives, 293
 – fièvre, 200
 Vision
 – baisse, migraine, 300
 – perte, voir Cécité
 – troubles de la, céphalées, 305
 Vitamine A, 298
 Vitamine D
 – prévention du rachitisme, 2
 – vomissements, 162
 Vitesse de sédimentation, voir VS
 Vol, 368
 Vomissements
 – aspirine, 162
 – céphalées, 182, 298
 – cycliques, syndrome, 163
 – diarrhée, 129, 134
 – digitaline, 162
 – galactosémie congénitale, 163
 – hernie étranglée, 158, 164
 – hyperplasie congénitale des surrénales, 162
 – hypertension intracrânienne, 298
 – iatrogènes, 162
 – insuffisance cardiaque, 162
 – intolérance au fructose, 163
 – méningite, 158, 164
 – migraine, 299, 300
 – néphropathie, 162
 – nourrisson, 64, 139, 157
 – occlusion, 161, 164
 – otite, 158
 – sanglants, 158, 184
 Voyages
 – alimentation, 417
 – diarrhée, 132, 136, 405
 – douleurs abdominales, 181
 – hydratation, 417
 – hygiène, 405, 417
 – vaccination, 114

VS, 458

Vulve, puberté, 325

Vulvite, 245, 347

Vulvovaginite, 245

W

Wiedemann-Beckwith, syndrome, 332

Y

Yersinia, 140

Z

Zovirax, voir Aciclovir